

CONSULTORIOS OFTALMOLOGICOS CABALLITO
Alta Complejidad

CAMARA ESTRECHA



Que Significa tener la CAMARA ESTRECHA?

Me asusto, me angustio, me preocupo?

NO! Pero si me tengo que ocupar!

El ojo es una estructura circunferencial, estanque, que se puede dividir en 2 Segmentos:


- El Segmento Anterior que comprende el espacio ubicado entre el cristalino (incluido) y la córnea.
- El Segmento Posterior ubicado detrás del cristalino (Humor Vitreo, Retina y Nervio Optico)



A su vez, el Segmento Anterior se subdivide en 2 Cámaras:

- La Cámara Anterior por delante del Iris
- y
- La Cámara Posterior por detrás del Iris


En su interior circula el Humor Acuoso, que es el líquido que le da Tono (Tensión) al ojo, y que determina la medida de la Presión Ocular.



El Humor Acuoso, es un líquido que en forma dinámica esta en constante proceso de formación en los procesos ciliares situados detrás del iris en la cámara posterior, circula y pasa a través de la pupila a la cámara anterior y se reabsorbe en el trabeculado (es como una alcantarilla de desagote) situado en el Angulo formado entre el Iris y la Córnea (Iridocorneal).

Es por esto que el volumen del líquido y por ende la presión se mantienen estables y constantes (Formación = Reabsorción)

Tener la **CÁMARA ESTRECHA** y por ende los Ángulos Iridocorneales más cerrados implica un riesgo potencial de que se impida la reabsorción del Humor Acuoso, el cual se sigue formando, generando así un súbito aumento del volumen de dicho líquido con el consiguiente aumento de la Presión Ocular, lo que se conoce como un **GLAUCOMA AGUDO** (Intenso dolor ocular, cefaleas, ojo rojo, visión borrosa, náuseas, vómitos, etc) Es una Emergencia Médica y debe tratarse inmediatamente.



(a) Cámara Estrecha y (b) Cámara Amplia

Si su Oftalmólogo sospecha la existencia de una CAMARA ESTRECHA, el estudio diagnóstico y pronóstico que le va a solicitar para certificarlo es una Ecografía Ocular llamada Ultrabiomicroscopia (UBM).

Es muy importante el diagnóstico ya que existen medidas profilácticas, terapéuticas y curativas.

- 1- Evitar ciertos Medicamentos (antiespasmódicos como la Buscapina, Sertal, algunos psicotrópicos, antidepresivos, antialérgicos, etc) Consultar
- 2- Realización de IRIDOTOMIA PERIFERICA YAG LASER
Es un Procedimiento de Consultorio (No es una Cirugía) y consiste en realizar una microperforación en la región superior y periférica del iris (un muy pequeño agujerito, que no se ve a simple vista) el cual funcionaria como una vía accesoria de circulación del liquido interno del ojo, descomprimiéndolo y evitando así el cierre angular y el aumento de la presión ocular.
Es Indoloro, seguro y de pocos minutos de duración por lo que no requiere de preparación previa ni cuidados posteriores.
- 3- La **Cirugía de Cataratas** es el Tratamiento curativo y definitivo de esta condición, en el caso de que justifique realizar dicho procedimiento.